

	PARTO SEGURO / MÃE PAULISTANA PROTOCOLO
Número: 001 Revisão: 00 Página: 10 de 15	ACOLHIMENTO OBSTÉTRICO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Profissionais Responsáveis

O ACCR deve ser feito por uma **equipe multiprofissional** composta por: **profissionais da recepção, técnico de enfermagem, enfermeiro obstetra, médico** e eventualmente, o serviço social.

No processo de acolher a gestante e seus familiares é necessário utilizar ferramentas como a comunicação adequada, educação, respeito, trabalho em equipe, rapidez, análise crítica da situação agindo com discrição e ética.

Condutas e Procedimentos Realizados pelo Enfermeiro Obstetra no Acolhimento

- Liderar a equipe de Enfermagem do acolhimento;
- Orientar os técnicos de enfermagem a apresentar-se nominalmente e chamar a gestante pelo nome;
- Coordenar os técnicos de enfermagem no esclarecimento das dúvidas da gestante a respeito da consulta de acolhimento e quanto a verificação dos sinais vitais de todas as gestantes atendidas;
- Supervisionar os técnicos na realização das anotações, inclusive as relativas à data e hora do atendimento e liberação da gestante pelo médico;
- Preencher Histórico de Enfermagem Obstétrica / SAE – Acolhimento;
- Orientar a gestante conforme queixa;
- Entregar o impresso de movimentação fetal e orientar às gestantes patológicas e às gestantes de termo com queixa de redução do movimento fetal;
- Ensinar a gestante quanto ao preenchimento do impresso de movimentação fetal (mobilograma) nos casos de gestante patológica e/ou as gestantes de termo com queixa de redução de movimento fetal;
- Solicitar avaliação médica;
- Esclarecer a gestante dispensada a respeito dos sinais e sintomas de trabalho de parto e de risco;
- Orientar os acompanhantes de gestantes menores de 18 anos ou com dificuldades cognitivas; ou as estrangeiras sobre assistência prestada e cuidados necessários, inclusive quanto aqueles dispensados no lar.
- Realizar/solicitar a cardiotocografia para as gestantes de 37 semanas (de termo) ou mais de gestação;
- Solicitar laudo médico do cardiotoco em duas vias e entregar uma via para a gestante;